




NOVA VERSÃO | VTPRO4

LG 36770



PRECOCIDADE COM GRÃOS PROFUNDOS E PESADOS



BENEFÍCIOS

- Alto potencial de produção
- Responsivo ao uso de tecnologia
- Profundidade de grãos
- Ótimo *dry down*



VT PRO 3⁺

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS



TECNOLOGIA RECOMENDADA ALTA



TIPO DE GRÃO DENTADO AMARELADO



FINALIDADE DE USO GRÃOS/SILAGEM



ÉPOCA DE PLANTIO SAFRA/SAFRINHA



ARQUITETURA FOLiar SEMIERETA



TOLERÂNCIA A NICOSULFURON SIM



MATURIDADE RELATIVA EM DIAS 136

REAÇÕES A DOENÇAS

	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	+
<i>Phaeosphaeria</i>		•	•	•	•	•	•	•			
Cercosporiose		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Helminthosporiose		•	•	•	•	•	•				
Ferrugem branca		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ferrugem comum		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ferrugem polissora		•	•	•	•	•	•				
Mancha de <i>diplodia</i>		•	•	•	•	•	•	•			
Antracnose de colmo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Mollicutes (enfazamentos)		•	•	•	•	•	•				
Viroses (mosaico)		•	•	•	•	•	•	•			
<i>Fusarium</i>		•	•	•	•	•	•	•			

*A reação a doenças pode sofrer variações em função do ambiente e da ocorrência de forte pressão do patógeno.

Notas: 9 = alta tolerância / 1 = suscetível

RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO

SAFRINHA

REGIÕES EDAFOCLIMÁTICAS	JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PR/MS												
SP												
MT/RO												
GO/DF (ALTO)												
MG												
GO (BAIXO)												
MATOPIBA												

VERÃO

REGIÕES EDAFOCLIMÁTICAS	JULHO				AGOSTO				SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
RS/SC/PR (BAIXO)																								
RS/SC/PR (ALTO)																								
MG																								
SP																								
GO/DF																								
BA																								
TO																								
MA/PI																								
NORDESTE																								

* Mesmo com alta tolerância, não dispensa a atenção especial ao controle da cigarrinha do milho, inseto vetor de espiroplasma e fitoplasma, causadores dos enfazamentos pálido e vermelho, respectivamente.

** Em situações de alta pressão de fusarium de colmo, pode ser necessária colheita antecipada.